

Spreeuw

Sturnus vulgaris

—
soortengroep: zangvogel

burgerlijke stand: overwintert in groep

favoriete maaltijd: larven en wormen

levensverwachting: maximaal 23 jaar

woonplaats: steden, parken en loofbossen

status: niet bedreigd

bijzonderheid: spreeuwen kunnen andere diersoorten imiteren. Ze doen moeiteloos kikkers, buizerds, spechten of zelfs kippen na!



als en vleem



De zwarte roodstaart

(Phoenicurus ochruros)

Herkenning

14,5 cm. Mannetje hoofdzakelijk zwart op kop, bovendelen en onderdelen; witte vleugelvlak, witte onderstaartdekveren, rode stuit en staart, maar middelste staartveren zijn donkerder. Vrouwtje is donkerbruin waar mannetje zwart is en heeft bleke oogring. Tilt met staart als gekraagde roodstaart. Vlucht zwak en fladderend.

Biotopen

Broedt in stedelijke gebieden en bij moderne boerderijen. Ze vinden holtes in muren en tal van andere plekken op industrieterreinen en bij grootschalige nieuwbouw om in te broeden. Ze verlaten de plaats wanneer de omgeving te groen wordt. Prefereert hoge zangposten van minimaal twintig meter zoals een antenne, hijskraan of dakrand. Tijdens de trek door het hele land te vinden.

Levenswijze


Voedsel ,Ongewervelden en vruchten. Zit op uitkijkpost, hipt en rent rond als een tapuit. Vangt ook vliegende insecten als vliegenvanger.

Zwarte roodstaart



- nieuwbouwwijken, stedelijk gebied
- droge, lichte en warme biotopen
- rotsen, industrieterreinen
- zingt voor zonsopkomst vanaf hoge post zoals schoorsteen
- broedt graag in gebouwen zoals onder dakpannen





Kleine vuurvlinder

(*Lycaena phlaeas*)

Verspreiding en leefgebied

De kleine vuurvlinder komt in heel het Palearctisch gebied algemeen voor. Ook in het Nearctisch gebied en in oostelijk Afrika komt de vlinder voor. De soort vliegt tot een hoogte van 2400 meter in berggebied. Hij komt ook boven de poolcirkel nog voor. De habitat bestaat vooral uit open gebieden, met name schrale graslanden en duinen en heide, maar de soort wordt ook in tuinen en wegbermen waargenomen.

De vliegtijd in Nederland en België is van maart tot en met oktober, in twee of drie jaarlijkse generaties. De vlinder is multivoltien, de grootste aantallen vlinders worden gezien in augustus en september.

Rups

De rups van de kleine vuurvlinder vertoont enige gelijkenis met een naaktslak. Hij is groen met een rozerode rand en rugstreep van variabele omvang en met witte spikkeltjes. Hij is lichtbehaard. De kleine kop is bruin. De volgroeide rups meet 15 tot 18 millimeter. Waardplanten die de kleine vuurvlinder in Nederland en België gebruikt zijn diverse soorten zuring, vooral schapenzuring (*Rumex acetosella*) en in mindere mate veldzuring (*Rumex acetosa*). Daarbuiten worden ook varkensgras (*Polygonum aviculare*) en alpenzuurkruid (*Oxyria digyna*) gemeld

Schapenzuring



Veldzuring



Varkensgras





LEEFGEBIED

Visdieven komen hoofdzakelijk voor in kustgebieden, maar ook in het binnenland zijn kolonies te vinden, in waterrijke graslanden en op platte grinddaken. Ook natuurontwikkelingsgebieden langs de grote rivieren voorzien in geschikte broedgelegenheid voor de visdief. Ze zoeken hun voedsel in zoete en zoute milieus: intergetijdenzone, kust, moeras, rivieren, beken en meren.

VOEDSEL

Bidt en duikt naar kleine visjes, zoals spiering. Tijdens de balts presenteren de vogels visjes aan elkaar.


VOGELTREK

Visdieven overwinteren voornamelijk langs de westkust van Zuid-Europa en Afrika, met name het kustgebied van Mauritanië en Nigeria. Een klein deel van de visdieven trekt helemaal door naar Zuid-Afrika. Ze volgen tijdens de trek de kustroute, maar ook over het binnenland, daarbij vooral het laagland opzoekend. Visdieven verschijnen vanaf eind maart. De meeste voorjaarstrek tussen half april en eind mei. Vanaf begin juli gaan er weer groepen richting het zuiden, wat doorgaat tot september/begin oktober.

BROEDEN

Heeft één legsel per jaar met 2-3 eieren in een nestkuiltje. Broedt meestal vanaf mei tot begin juni. Broedduur: 21-24 dagen. Visdieven broeden in kolonies op rustige, spaarzame begroeide terreinen aan de kust en bij binnenwateren, maar soms ook op daken in het westen en noorden van Nederland. De jongen kunnen na 23-27 dagen vliegen.





Fint

Alosa fallax

soortengroep: Clupeidae (haringen, sardines)

burgerlijke stand: zwemt rond met een school

favoriete maaltijd: plankton en kleine visjes

levensverwachting: 6 tot 7 jaar

woonplaats: reist tussen de zee, mondingen en rivieren

status: bedreigd, maar beschermd

bijzonderheid: De fint wordt geboren in zoet water, maar trekt dan naar zee, waar hij het grootste deel van zijn leven doorbrengt alvorens terug te keren naar zijn geboorteplaats om zich voort te planten.

